



**La Société Régionale de Santé Publique du Languedoc Roussillon
organise le samedi 13 janvier 2007- de 15h à 17 h à la salle Rabelais
une conférence débat ouverte aux professionnels et au grand public**

LA BRONCHIOLITE, CE QU'IL FAUT SAVOIR....

**Elle est organisée en partenariat avec la Société Française de Santé Publique
et avec le soutien de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie,
la Société Française de Pédiatrie et
l'Institut National de Prévention et d'Education à la Santé.**

On dénombre chaque année 460 000 cas de bronchiolite parmi les enfants de 0 à 2 ans, soit 30 % des nourrissons. Plus de la moitié des cas ayant recours aux urgences (57 %) sont des nourrissons de moins de 6 mois et 86 % de moins de 1 an. Les cas de bronchiolite recensés chez les enfants de moins de 1 an donnent lieu à une hospitalisation dans 37 % des cas suite au recours aux urgences. Cette épidémie débute généralement à la mi-octobre, pour atteindre un pic en décembre. Elle se termine à la fin de l'hiver.

Cette année, la situation épidémiologique au 20 décembre 2006 confirme le ralentissement de l'épidémie saisonnière 2006 de bronchiolite. Le nombre d'enfants touchés ayant recours aux urgences hospitalières est en baisse pour la deuxième semaine consécutive. De nombreux cas restent cependant toujours recensés sur l'ensemble du territoire (Institut National de Veille Sanitaire 20 déc 2006).

La bronchiolite, qu'est ce que c'est ?

La bronchiolite est une maladie des petites bronches due à un virus répandu et très contagieux qui se transmet par

- la salive,
- les éternuements,
- la toux,
- le matériel souillé par une personne enrhumée et par les mains.

Ainsi, le rhume de l'enfant et de l'adulte peut-être à l'origine d'une bronchiolite chez le nourrisson.

Gestes et précautions de prévention :

- se laver systématiquement les mains à l'eau et au savon avant de s'occuper d'un bébé,
- éviter d'emmener bébé dans des endroits publics où il risquerait d'y avoir des personnes enrhumées (centres commerciaux, transports en commun...), et de l'exposer à des environnements enfumés,
- ne pas embrasser l'enfant sur le visage lorsque l'on est enrhumé ou que l'on a des symptômes grippaux,
- ne pas échanger dans la famille les biberons, sucettes, couverts non nettoyés.

+++ En cas de signes de bronchiolite il ne faut surtout pas hésiter à prendre l'avis du médecin traitant avant de se rendre à l'hôpital.